

La Compañía de Especialidades de leche

Los Factores Importantes de la Salud del Becerro

- Proporcione un lugar limpio, seco, y desinfectada para parir.
- Separa el becerro y la madre inmediatamente después de nacimiento.
- Empape ombligo inmediatamente con yodo de 7%.
- Ponga el becerro en un ambiente seco y limpia - está seguro dar sombra en el verano.
- Alimente 3-4 cuartos de galón colostro de alta calidad inmediatamente - alimente con fuerza si es necesario.
- Mantenga becerro aislado de otros animales hasta destetado.
- Alimente por lo menos 4 cuartos de galón de polvo de leche mezclado bien y de alta calidad diariamente.
- Siempre proporcione agua fresco.
- Proporcione grano fresco y de alta calidad, (no heno) después de 3 días de la edad. Becerros se pueden destetar después de comen por lo menos 1.5 libras de grano por 2-3 días consecutivos.
- Alimente por lo menos 4 cuartos de galón de polvo de leche y 4 cuartos de galón de electrolitos a becerros con diahrea.



**RENAISSANCE
NUTRITION**

Renaissance Nutrition

P.O. Box 229 – 481 Frederick Road
Roaring Spring, PA 16673

1-800-346-3649

Solutions for Success